

## 第一章

# 緒論

---

- (D) 1. 依照世界衛生組織之建議，小兒科護理的服務對象，為幾歲以下？(A)10 歲 (B)12 歲 (C)15 歲 (D)18 歲。 【'05.士普】
- (A) 2. 民國 92 年修訂的兒童及少年福利法，所定義的「兒童」是指幾歲以下的兒童？(A)12 歲 (B)15 歲 (C)18 歲 (D)10 歲。 【'07.師高】
- (C) 3. 2003 年修訂的兒童及少年福利法中，「少年」是指幾歲以下的兒童？(A) 12 歲以下 (B)12~15 歲 (C)12~18 歲 (D)10~20 歲。
- (D) 4. 2003 年公布之「兒童及少年福利法」，其適用之年齡範圍為：(A)未滿 12 歲 (B)未滿 15 歲 (C)未滿 16 歲 (D)未滿 18 歲。 【'06.師高】
- (A) 5. 依據 101 年 8 月 8 日修正的兒童及少年福利與權益保障法，當護理師知悉兒童施用毒品時，應於幾小時內向主管機關通報？(A)24 (B)48 (C)72 (D)96。 【'14.師高】
- (B) 6. 兒科護理最新趨勢為：(A)以照護為中心 (B)以家庭為中心 (C)以治療為中心 (D)以預防為中心。 【'08.師高】
- (A) 7. 以家庭為中心的兒科護理概念，不包括：(A)病童住院時，要求父母必須在院執行病童的護理 (B)教導父母，照顧病童所需的知識和技巧 (C)評估病童家人，不能參與照顧活動的原因 (D)鼓勵病童家庭成員，說出對病童疾病的看法。 【'05.師檢】
- (C) 8. 下列有關台灣地區兒童健康問題的變遷（行政院衛生署，2001 年）的敘述，何者不正確？(A)兒童因感染而引起的死亡率已有下降之趨勢 (B)兒童罹患惡性腫瘤之死亡率仍逐年升高現象 (C)兒童期先天性畸形之死亡率已因優生保健而降低 (D)兒童事故傷害的死亡率仍有偏高現象。 【'04.師檢】
- (A) 9. 根據我國近 3 年生命統計資料，顯示 1~14 歲兒童主要死亡原因前 3 位，不包括下列何者？(A)氣喘 (B)事故傷害 (C)惡性腫瘤 (D)先天性畸形。 【'14.師高②】
- (C) 10. 行政院衛生署國民健康局，設定我國嬰幼兒健康促進及保護計畫目標，針對 1~14 歲兒童之目標，在減少哪一項死亡率？(A)兒童癌症 (B)呼吸及腸胃道感染性疾病 (C)事故傷害 (D)先天代謝性異常。 【'04.士普】
- (D) 11. 下列何者不是我國兒童常見的健康問題？(A)齲齒 (B)發展遲緩 (C)視力問題 (D)頭蝨。 【'12.專高】

## 2 護理考試叢書(四)兒科護理學

- (D) 12. 有關兒科護理人員的角色和功能，下列敘述何者錯誤？(A)配合國家及兒童福利政策 (B)配合醫療體系之發展 (C)注意兒童疾病型態的改變 (D)提供照護的兒童僅限於 15 歲以下。 【'07.師高】
- (B) 13. 有關兒科護理的敘述，下列何者錯誤？(A)照顧兒童及青少年，需要注意其有著脆弱性高及發展不成熟的特點 (B)兒童的表達能力差，應以家庭主要照顧者提供的資料為唯一的判斷依據 (C)兒科護理人員必須了解兒童的正常生長發育過程，才能提供適當的照顧 (D)兒科護理強調以家庭為中心的護理，並重視人權與倫理法規。 【'09.師普】
- (D) 14. 曉雲，14 歲，因體重快速減輕而入院，醫師診斷為厭食症，護理師為曉雲擬訂護理計畫中，下列何項護理處置須優先處理？(A)改善與家人的互動關係 (B)教導其個人應對能力 (C)心理諮商以矯正身體心像 (D)改善嚴重的營養不良。 【'14.師高②】

【解析】排列健康問題的優先順序為：一、對生命有威脅的健康問題；二、依馬斯洛需要層次；三、護理對象的自我感受調適因素，因此，上述選項為「嚴重的營養不良」是對生命最具有威脅的。

## 第二章

## 兒童的生長與發展

- (A) 1. 人體神經系統發展最快速的時期是：(A)6 歲以前 (B)7~9 歲 (C)10~12 歲 (D)13 歲以上。 【'00.普考】
- (B) 2. 兒童腦容量的發育，何時可達其成人時的 50%？(A)出生時 (B)1 歲時 (C)3 歲時 (D)5 歲時。 【'02.師高】
- (A) 3. 嬰兒時期，凶門出現下列何種情況，須建議接受進一步的評估檢查？(A)前凶門 6 個月關閉 (B)後凶門呈倒三角形 (C)前凶門可摸到脈動 (D)哭泣時凶門膨出。 【'04.師檢】
- (C) 4. 下列何者為新生兒的腦和神經系統發育所最需要的營養素？(A)蛋白質 (B)鐵 (C)脂肪 (D)胺基酸。 【'09.專普】
- (B) 5. 有關新生兒及嬰幼兒脊柱彎曲的變化，下列何者正確？(A)新生兒出現，頸椎原發彎曲 (B)3 個月嬰兒出現，頸椎續發彎曲 (C)5 個月嬰兒出現，腰椎續發彎曲 (D)7 個月嬰兒出現，薦椎原發彎曲。 【'05.師高】
- (D) 6. 有關嬰兒呼吸系統解剖構造之敘述，下列何者錯誤？(A)歐氏管較成人短、寬且直 (B)嬰兒喉頭在頸部較高處（約在第 2 頸椎處） (C)肺泡數目較少、肺泡表面積相對減少，使得呼吸換氣量較少 (D)嬰兒的胸部呈橢圓形，在 1 歲以後呈圓桶狀。 【'07.師高】
- 【解析】出生時前後徑與左右徑相同，胸部是圓桶形；當成人時期前後徑較左右徑短，而較平坦。
- (D) 7. 有關兒童骨骼系統之敘述，下列何者錯誤？(A)在生長過程中，骨骼年齡與實際年齡具平行關係 (B)胎兒在第 5 個月便有骨化之機能出現 (C)骨骼發生的順序，從鎖骨，膜狀骨，至四肢及骨椎 (D)在 3 歲之前，手腕部之 X 光片，可提供有用的骨骼年齡鑑定。 【'01.師檢】
- (B) 8. 兒童之腎絲球過濾率(GFR)，在幾歲左右才可以達到成人的標準？(A)出生時 (B)2 歲時 (C)4 歲時 (D)8 歲時。 【'01.師檢】
- (C) 9. 下列哪一項因素，使得嬰兒容易面臨體液不平衡的情況？(A)嬰兒身體內的水分總量，占體重之 50~60%，而成人的水份占體重之 70~80% (B)嬰兒有較低的新陳代謝率 (C)嬰兒的腎功能較不成熟 (D)嬰兒的體表面積與體重的比率，比成人小。 【'05.士普】
- (B) 10. 體液及電解質不平衡對嬰幼兒所造成的危險性比對成人來得嚴重，造成這些危險性的主要因素中，不包括下列哪一項？(A)嬰幼兒身體內的水分總

#### 4 護理考試叢書(四)兒科護理學

量占體重之 70~80%，而成人的水分占體重之 50~60% (B)嬰幼兒有較低的新陳代謝率 (C)新生兒腎小球過濾率只達成人的 30~50% (D)嬰幼兒的體表面積與體重的比率比人大。 【'03.專高】

- (D) 11. 下列何項發展，在幼兒期尚未達到成人的標準？(A)腎絲球過濾率 (B)唾腺的分泌功能 (C)IgG 的功能 (D)視力的發展。 【'10.專技普考】
- (A) 12. 有關正常的兒童吞嚥動作之說明，何者有誤？(A)嬰兒 3、4 週大時即會嘗試有意識控制吞嚥 (B)上食道括約肌有預防食物進入咽部及肺部之反射動作 (C)下食道括約肌可預防胃內食物回流至食道中 (D)食團會對咽喉部刺激引發腦髓質命令軟腭上提。 【'03.師檢】 【'00.師高】

【解析】嬰兒時期之吞嚥為反射動作。

- (B) 13. 下列有關兒童消化系統的特性，何者不正確？(A)唾液的分泌量，隨著年齡長大而增加 (B)胃容量在出生時約有 120ml，隨著年齡長大而增加 (C)嬰兒缺乏胰臟所分泌的澱粉酶，所以對澱粉的消化和吸收較有困難 (D)新生兒的胃賁門括約肌控制未成熟，所以餵食後常會出現回流現象。 【'05.士普】
- (A) 14. 哺餵母乳可加強嬰兒的抵抗力，主要因母乳富含下列何種抗體？(A)IgA (B)IgD (C)IgE (D)IgG。 【'10.專技高考】
- (A) 15. 有關母乳與牛奶的比較，下列何者正確？(A)母乳中所含之不飽和脂肪酸較多 (B)牛奶中所含之乳糖較多 (C)牛奶有較高之鈣磷比 (D)母乳中所含之酪蛋白較多。 【'10.專技普考】
- (C) 16. 有關嬰兒添加副食品之敘述，下列何者錯誤？(A)每次只給一種新食物，且由一小匙開始後再酌量增加 (B)添加副食品後，可由大便和皮膚來觀察有無過敏反應 (C)將新食物混合到牛奶中，可以促進嬰兒接受新食物 (D)需確定嬰兒對所添加之副食品適應後，方可添加另一種新食物。 【'08.士普】
- (D) 17. 芳芳 6 個月大，護理人員在指導芳芳的媽媽有關副食品添加的原則，下列敘述何者錯誤？(A)每種新食物由一小匙開始餵，再逐漸增加 (B)1 次增加一種新的食物 (C)每一種新食物的添加，要間隔 4~7 天 (D)將新食物加到牛奶中，使芳芳較快適應新食物。 【'12.專普】
- (D) 18. 嬰兒在餵奶後，易發生回流(regurgitation)現象的原因，不包括：(A)賁門括約肌不成熟 (B)餵食後未給予拍背排氣 (C)胃容量較小 (D)腸蠕動較慢。 【'08.士普】
- (B) 19. 母親因幼兒期的兒子進食不佳而煩惱，此時護士最好的反應是甚麼？(A)每天給他吃多種維生素，幫助增加他的食慾 (B)幼兒期的兒童通常吃的較少，試著三餐給他少量和每餐間給點心 (C)最好給兒童一天三餐，限制

點心，以增加他的食慾 (D)如果你給他多一點牛奶和果汁，將可填補他正餐吃的不足。 【'05.師高】

【解析】剛學會走路之幼兒，大部分會出現食慾差、吃得少現象，一般稱為生理性厭食，除了身體需要量減少外，注意力也易因外界刺激而分散，應採少量多餐，兩餐之間再補充點心。

(D) 20. 6 歲胖虎正值換牙時期，其最先長出的第一顆永久齒為：(A)門齒 (B)犬齒 (C)第一前臼齒 (D)第一臼齒。 【'04.士檢】

(B) 21. 小貝貝 2 歲半，目前的牙齒狀況應為：(A)乳齒約 6~8 顆 (B)乳齒已全部長出 (C)恆齒正要開始長 (D)恆齒已完全長齊。 【'07.士普】

(B) 22. 正常 3 歲兒童牙齒數目應為：(A)16 顆 (B)20 顆 (C)24 顆 (D)28 顆。 【'07.士普】

(B) 23. 有關兒童牙齒發展的敘述，下列何者正確？(A)不論乳齒或恆齒上排中央門牙最早長出 (B)約 2 歲半時，20 顆乳齒可全數長出 (C)恆齒的第一大白齒長出時間約在 9 歲左右 (D)通常男孩比女孩先長牙。 【'06.師高】

(A) 24. 為了促進兒童牙齒的健康，兒童需在何時開始接受常規的牙科檢查？(A)第一顆乳牙長出時 (B)乳牙全部長出時 (C)第一顆恆久齒長出時 (D)恆久齒全部長出時。 【'04.士檢】

【解析】1 歲半以後應「定期」接受口腔檢查，而(A)為 6 個月；(B)為 2 歲半；(C)為 6 歲；(D)為 28 歲左右，故(A)較為接近。另外，口腔護理則在乳牙未長出前開始，於進食後即要執行，以維護口腔清潔。

(B) 25. 對於幼兒期兒童的牙齒保健，下列敘述何者為是？(A)為讓幼兒表現自主性，可讓幼兒自己刷牙，父母不必協助之 (B)給幼兒吸食棒棒糖比咬食巧克力棒更易引起齲齒 (C)為徹底清潔牙縫，幼兒宜選擇長短不一的長毛牙刷 (D)為避免撐大幼兒牙縫，幼兒不宜使用牙線。 【'04.師檢】

【解析】因吸食棒棒糖其留在口腔內之時間比咬食來得久，易導致齲齒機會也較大。

(A) 26. 兒童的身體比例成長的說明，何者正確？(A)出生時，頭部比例，約占全身的 1/4 (B)出生時，身體的中點，約在肚臍處 (C)青春期時，頭部比例，約占全身的 1/6 (D)青春期時，身體的中點，約在肚臍下 2 公分。 【'05.士普】

【解析】(A)2 歲內頭與身高比例為 1:4；(B)出生時，身體中點近臍上 2 公分；(C)青春期頭與身長比例為 1:8；(D)青春期身體中點約在恥骨聯合。

(C) 27. 有關新生兒清醒及睡眠週期的敘述，下列何者最正確？(A)早產兒清醒及睡眠週期的時間較足月兒規律且穩定 (B)新生兒年齡愈大睡眠時間愈長 (C)一個月大新生兒，一次清醒及睡眠週期的時間約為 4 小時 (D)清醒及睡眠週期是學習而來，剛出生新生兒無此變化。 【'09.專普】

## 6 護理考試叢書(四)兒科護理學

- (D) 28. 兒童發展過程的共同模式是：①由首到尾②由尾到首③由特殊到整體④由軀幹到四肢。(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④。 【'07.士普】
- (B) 29. 有關兒童發展的原則，下列敘述何者錯誤？(A)發展具有關鍵期 (B)各項發展在同時以同速度進行 (C)早期發展是晚期發展的基礎 (D)發展的進行由簡單到複雜。 【'07.士普】 【'00.士普】
- (A) 30. 嬰兒先學會抬手，而後才會抓，進而以手指取物的發展原則稱為：(A)近遠原則 (B)頭尾原則 (C)由簡單到複雜原則 (D)功能不對稱原則。 【'04.士檢】
- (C) 31. 有關嬰幼兒發展的原則，下列何者錯誤？(A)發展常遵循可預知的模式 (B)共同的模式下有個別差異 (C)身體各系統的發展速度，常呈現一致性 (D)早期發展奠定後期的基礎。 【'10.專技高考】
- (C) 32. 有關嬰兒的成長與發展，下列何者錯誤？(A)一般頭頸的肌肉比軀幹及四肢先成熟 (B)頭佔身體長度的 1/4 (C)行為與認知的發展是由生物遺傳基因所塑造 (D)早期的反射與後期的動作發展有密切之關聯性。 【'06.師高】
- 【解析】行為與認知發展亦受後天環境影響，並非僅由生物基因遺傳所塑造。
- (A) 33. 有關兒童成長與發展之敘述，下列何者正確？(A)是持續、依序的，並依循頭尾律及由中心向外發展的原則漸進發展的 (B)許多行為及特質的發展在敏感期較不受環境的影響 (C)每個個體的成長與達成發展里程碑速率皆差不多 (D)各個身體系統或器官成長的型態與速率相近。 【'07.師高】
- (C) 34. 人的一生中，生理發展最快速的二個時期是：(A)胎兒期與嬰兒期 (B)幼兒期與學齡期 (C)嬰兒期與青春前期 (D)學齡期與青春前期。 【'06.專普】
- (B) 35. 下列有關兒童生理發展之敘述，何者正確？(A)嬰兒期與學齡期皆屬於生長快速期 (B)滿週歲時體重是出生體重的 3 倍 (C)新生兒時胸圍等於頭圍 (D)前囟門在 6~8 個月時閉合，後囟門在 12~18 個月時閉合。 【'02.師檢】
- (A) 36. 對於一個 4 個月大的嬰兒，護理人員並不會期望他具備下列何種行為？(A)獨自坐得很穩 (B)能夠左右轉身 (C)對人微笑 (D)當拉著坐起時，頭不再向後倒。 【'04.士檢】
- (C) 37. 出生多大時，嬰兒從臥位拉起時，頭部可以穩定控制，不會後倒？(A)1 個月 (B)2~3 個月 (C)4~5 個月 (D)6~7 個月。 【'05.士普】
- (A) 38. 6 個月大的嬰兒應該正在發展下列哪一項動作？(A)不需支持能坐穩 (B)翻身 (C)以四肢爬行 (D)拉住家具站起來。 【'08.師高】
- (c,d) 39. 為 8 個月的小萱進行頭頸部評估，以下結果何者異常？(A)後囟門已關閉 (B)測得頭圍為 43 公分 (C)頭圍比胸圍多 2 公分 (D)將小萱採直立姿勢，檢查其前囟門為輕微膨出。 【'04.專普】